

VALORACIÓ SECUNDÀRIA DE LESIONS

HEMORRÀGIES SHOCK

Es pot parlar de **SHOCK**, de qualsevol origen, quan es produeix una **baixada brusca de la Tensió Arterial i a la vegada un augment de la Freqüència Cardíaca**. Es manifesta per l'estat de pal·lidesa, fred, suor i pols feble, més feble com més llunyà del cor.

Pot produir-se per un sagnat important, intern o extern, però també degut a traumatismes importants, reaccions de tipus al·lèrgic i problemes d'origen cardíac.


HEMORRÀGIA GREU

És la sortida de sang abundant i imparable a través de la ferida o d'un tall.



PROCEDIMENT

- **Feu pressió directa sobre la ferida amb el taló de la mà, cobrint-la amb draps estèrils o nets.** La majoria de les vegades s'atura així l'hemorràgia.
- **Si continua sagnant:** pressioneu fort per sobre del punt que sagna i al mateix temps, aixequen l'extremitat.
- **Si s'atura l'hemorràgia:** continueu fent pressió fins que rebí assistència.



- **Si l'accidentat està pàl·lid, marejat, suat i té les mans i els peus freds (signes propis de shock) :** aixequen-li les cames.
- **Si en una estona no millora:** traslladeu-lo ràpidament per mitjans propis (pot tenir conseqüències greus).
- **!!! És desaconsellable l'aplicació d'un torniquet: La majoria d'hemorràgies es poden controlar amb les actuacions anteriors. L'aplicació d'un torniquet pot acabar amb l'amputació de l'extremitat !!!**



PRECAUCIONS

- **Si hi ha algun objecte punxant a la ferida (un ganivet, una punxa, etc.): No treure-li.**

FERIDES

Són lesions traumàtiques caracteritzades pel trencament de la pell, produït per un agent extern o intern, causant una hemorràgia.



PROCEDIMENT

- Renteu-vos les mans amb aigua i sabó abans i després de curar la ferida.
- Renteu la ferida amb aigua i sabó i aplicar qualsevol desinfectant líquid (p.ex. un antisèptic amb dissolució iodada).
- Protegiu-la amb una gasa i esparadrap.
- Cal considerar si estan correctament vacunats contra el tètanus.



PRECAUCIONS

- No utilitzar cotó per netejar les ferides.
- No netejar només amb aigua oxigenada o alcohol.
- No posar-hi pomades de cap tipus.




HEMORRÀGIA NASSAL



PROCEDIMENT

Tant si l'hemorràgia no té causa aparent com si és de causa traumàtica, l'actuació serà la mateixa. Únicament caldrà observar si en les traumàtiques apareix inflamació i dolor a la zona: en aquest cas, caldrà portar l'accidentat a un servei d'urgències per valorar possibles fractures.



- Mantindrem el cap dret .
- Feu compressió al nas sobre el costat que sagna durant 5-10 minuts i inclineu el cap endavant.
- Comproveu si ha deixat de sagnar (normalment haurà estat suficient).
- Si no ha parat, porteu-lo a un servei d'urgències continuant amb la compressió.



PRECAUCIONS

- No l'estireu a terra (no serveix de res aixecar un braç).
- No li tireu el cap enrera.
- No li poseu res dins del forat del nas.

CREMADES

Si l'incendi no s'ha pogut apagar en 30 segons, aviseu els bombers



PROCEDIMENT

- Separeu-lo del foc
- Apagueu el foc del cos amb una manta o fent-lo rodar per terra
- Comproveu si està conscient
- Pregunteu-li com es troba
- Doneu-li copets a la cara:

Si NO RESPON

Vegeu: **REANIMACIÓ CARDIO-PULMONAR**

A

Si RESPON

- Refredeu la cremada amb aigua freda fins que disminueix el dolor.
- Protegiu la cremada amb una gasa.



Refredeu i protegiu la cremada amb una gasa



PRECAUCIONS

- No arranqueu la roba enganxada.
- No hi poseu ni olis ni pomades.
- No rebenteu les butllofes.